갑상샘암의 선별과 무증상 갑상샘종의 관리

Review

조정진*

한림대학교 성심병원 가정의학과

Screening of Thyroid Cancer and Management of Thyroid Incidentaloma

Jung Jin Cho*

Department of Family Medicine, Hallym University Sacred Heart Hospital, Anyang, Korea

Increasing thyroid cancer incidence is due to the increased detection of small papillary cancers and may not interpreted as an increase in the true occurrence of disease. Further workup of thyroid incidentalomas—impalpable nodules detected fortuitously during a radiological investigation—may contribute to the increasing thyroid cancer. Screening asymptomatic adults or children for thyroid cancer using either neck palpation or ultrasonography is not recommended in the US Preventive Services Task Force and the Korean lifetime health maintenance program. Generally, only thyroid incidentalomas > 1 cm should be evaluated, since they have a greater potential to be clinically significant cancers and thyroid nodules < 1 cm that require evaluation because of suspicious US findings, associated lymphadenopathy, a history of head and neck irradiation, or a history of thyroid cancer in one or more first-degree relatives.

Keywords: Thyroid Neoplasms; Screening; Thyroid Incidentaloma

서론

최근 갑상샘암이 급격히 증가하고 있다. 또한 갑상샘 초음파 검사가 보편화되고 종합검진에서 선별검사로 갑상샘 초음파검사가 포함된 경우가 많아져서 촉진되지 않지만 우연히 발견되는 갑상샘종(thyroid incidentaloma, occult thyroid nodule)의 발견이 많아지고 있다. 만져지지 않는 무증상 갑상샘종은 많은 임상 의들에게 추가 검사나 치료에 대한 새로운 고민을 던져주고 있다. 더구나 이런 과정을 거쳐 치명률이 낮은 갑상샘암을 초기에 발견 치료하는 것이 적절한지에 대한 논란이

제기되고 있다. 따라서 이 글에서는 갑상샘암의 발생현황 및 선별검사와 무증상 갑상샘종의 관리방안에 대해 살펴보고자 한다.

갑상샘암의 증가와 조기암 선별 권고안

국내에서 갑상샘암은 급격히 증가하고 있다. 갑상샘암은 최근 10년 내 가장 급속히 증가하는 암으로 등록분률로 보면 1990년 2.6%로 9위였다가 2000년 3.5%로 7위였는데 최근 2003–2005년 7.6%로 5위를 차지하고 있어 연간 증가율이 25.5%에 이르고 있다. 특히 여성에서 급격히 증가하여 1990년 5.1%로 6위 2000년 6.9%로 5위, 최근 2003–2005년 36.2%로 2위로 차지하고 있다. 국내에서는 2007년 인구 10만명당 조발생률은 43.1건이었고, 여자에서는 73.5명, 남자에서는 12.3명이다(Figure 1).¹⁾ 이러한 증가는 국내적 현상만이 아니다. 미국에서는 1973년 10만명당 3.6명이던 발생률이 2002년에 8.7명

Received: November 23, 2009, Accepted: January 15, 2010

*Corresponding Author: Jung Jin Cho

Tel: 031-380-1783, Fax: 031-380-1782

E-mail: threej@hallym.or.kr

Korean Journal of Family Medicine

Copyright © 2010 by The Korean Academy of Family Medicine

Figure 1. Incidence of thyroid cancer in Korea (1999–2007).

으로 증가하여 2.4배 증가한 것으로 나타났다.²⁾ 이 자료에 따르면 1988–2002년 동안 증가한 갑상샘암은 주로 유두암이 증가한 것이고, 특히 2 cm 이하 크기만 증가한 것으로 나타났다 (Figure 2). 국내에서 조직학적 분류에 따른 결과를 보면 유두암이 92.8%, 여포성암 3.8%로 유두암이 90% 이상 높은 것은 미국과 유사하다.¹⁾

유병률은 급격히 증가하는데 반해 미국에서 갑상샘암 사망률은 1973년부터 2002년 사이 10만명당 0.5명으로 변화가 없었으며,²⁾ 국내 사망률도 역시 변화가 없었다 (Figure 3).¹⁾ 미국의 갑상샘암 발생의 급격한 증가는 작은 유두암의 발견이 증가한 것이고 사망률의 변화없이 전임상단계의 갑상샘암이 검사의 증가로 일찍 발견된 것으로 해석하고 있다.²⁾

하지만 국내 갑상샘암의 증가는 미국보다 높다. 국내 유병

Figure 2. Trends in incidence of thyroid cancer (1973–2002) and papillary tumors by size (1988–2002) in the United States. Reprinted with permission from JAMA 2006;295:2166. Figure 1. Copyright © 2003. American Medical Association. All rights reserved.

Figure 3. Trends in mortality of thyroid cancer in Korea (2000–2007) (A) and in USA (1973–2002) (B). B: Reprinted with permission from JAMA 2006;295:2166. Figure 2. Copyright © 2003. American Medical Association. All rights reserved.

률은 2002년 세계 암발생에 관한 연구에서 보고한 10만 명당 발생률인 남자 1.3명, 여자 3.3명에 비해 높다.³⁾ 국내 갑상샘암

의 발생률은 미국 전체 발생률에 비해 높은 편이지만, 미국의 인종별 발생률에 관한 연구에 나타난 결과와 비교해보면 미

Figure 4. Incidence of thyroid cancer by age in Korea (2007) (A) and by age and Ethnicity in USA (1992-1998)(B). B: Reprinted with permission from Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003;12:145. Figure 1.

Table 1. Recommendations for screening of thyroid cancer.

Group	Asymptomatic adult	High risk group
US Preventive Services Task Force ⁴⁾ (1996, update in progress)	Screening asymptomatic adults or children for thyroid cancer using either neck palpation or ultrasonography is not recommended ("D" recommendation).	Although there is insufficient evidence to recommend for or against such screening in asymptomatic persons with a history of external upper body (primarily head and neck) irradiation in infancy or childhood, recommendations for periodic palpation of the thyroid gland in such persons may be made on other grounds, including patient preference or anxiety regarding their increased risk of cancer ("C" recommendation).
American Cancer Society (2009.4) ⁵⁾	Although blood tests or thyroid ultrasound often find changes in the thyroid, these tests are not recommended for early detection unless there is a reason (such as family history) to suspect a person is at increased risk for thyroid cancer.	People with a family history of medullary thyroid carcinoma (MTC) with or without type 2 multiple endocrine neoplasia (MEN 2) may be at very high risk for developing this cancer.
British Thyroid Association (2007) ⁶⁾	At present there is no screening programme to detect thyroid cancer for the general population.	While screening generally is not possible, a family history for thyroid cancer should be taken in each case and if there is a strong familial incidence of thyroid cancer or association with other cancers, genetic advice should be considered in appropriate cases from the regional genetics service (IV, C).
Korean Lifetime Health Maintenance Program (2009) ⁷⁾	Screening asymptomatic adults or children for thyroid cancer using either neck palpation or ultrasonography is not recommended ("D" recommendation).	Although there is insufficient evidence to recommend for or against such screening in asymptomatic persons with a history of external upper body (primarily head and neck) irradiation in infancy or childhood, recommendations for periodic palpation of the thyroid gland in such persons may be made on other grounds, including patient preference or anxiety regarding their increased risk of cancer ("C" recommendation).

국내 아시아인과 유사한 유병률을 보여주고 있다.⁸⁾ 그러나 미국 아시아인에서는 연령이 증가하면서 증가하는데⁸⁾ 반해 한국에서는 연령에 증가함에 따라 유병률이 감소하는 것도¹⁾ 한국에서 젊은 연령의 갑상샘암 증가가 검진에 의해 미리 발견됨을 시사한다고 보여진다(Figure 4).

갑상샘암이 증가하는데 갑상샘암의 조기발견을 위해 검사가 필요할까? 이에 대한 자세한 내용은 한국인의 평생건강 관리 갑상샘암에 자세히 서술되어 있다.⁷⁾

선별검사의 타당성이 있으려면 다음 4가지 사항에 대한 근거가 있어야 한다. 첫째, 중요한 건강문제여야 하며, 둘째, 무증상 시기에 손쉽게 받아들일 수 있는 정확한 검사방법이 있어야 하며 셋째, 조기발견의 효과가 있어야 하며 넷째, 검진의 이득과 손해를 따져서 이득이 커야 한다.

갑상샘암은 첫째, 둘째 조건은 만족한다. 중요한 건강문제이고 경부축진보다 상대적으로 민감도가 탁월하고 손쉬운 초음파라는 검사가 있다. 물론 최근 갑상샘암이 작더라도 국소 전이에 대한 우려가 있다. 즉 갑상샘암이 1.5 cm 이하라도 국소 임파선 전이 20%, 격막의 전이 59.1%, 53개월 이후 국소 재발 0.014%를 보인다는 보고⁹⁾와 1 cm 이하라도 주위조직 침범 28.1%, 임파선전이 30.1%였으나 원격전이는 없다.¹⁰⁾ 하지만 무증상 성인에서 갑상샘암을 미리 선별하는 것이 사망률 감소에 영향을 준다는 연구결과가 없고, 비록 집단검진을 통해 발견한 갑상샘암이 크기가 작고 임파선 전이(38% 대 68%)가 적지만 장기 예후를 좋게 한다는 증거를 발견할 수 없다.¹¹⁾ 즉 세 번째 조건을 위배한다. 이러한 이유로 대부분 단체에서 무증상 성인에서 축진이나 초음파 검사에 의한 선별검사를 추천하지 않는다(Table 1). 더군다나 다음 장에서 언급되는 것처럼 갑상샘종의 유병률이 최고 60%까지 보고될 정도로 매우 높아, 초음파 선별검사는 높은 위양성률이 문제가 된다. 일단 초음파를 시행하면 나이에 따라 다르지만 30-60%에서 결절이 발견되고, 이로 인해 불필요한 미세침천자흡입생검(FNAB)이 광범위하게 시행될 수 있다. 더군다나 우연히 발견된 후에 수술해도 장기예후가 다르지 않는데, 국소재발을 보이는 0.014%를 위해 많은 사람들이 미리 수술하고 더 오랫동안 갑상샘 호르몬약제를 장기 복용해야 하는 측면까지 고려한다면 이득보다 손해가 크다고 보여진다. 이러한 논리는 무증상성인에서 갑상샘종을 발견하기 위한 초음파검사에도 같이 적용된다고 보여진다.

무증상 갑상샘종의 관리

축진상 만져지지 않지만 초음파 검사 등 영상의학적 검사 과정에서 우연히 발견되는 갑상샘종을 무증상 갑상샘종이라고 정의하며 크기에 대한 정의는 명확히 할 수 없지만 무증상 갑상샘종은 대개 1 cm 이하인 경우로 정의한다. 물론 갑상샘종이 크기가 1 cm 이상이나 간혹 2 cm 이상의 갑상샘종도 갑상샘의 뒷면에 있거나 목 속 깊은 곳에 위치해 있다면 숙련된 의사의 진찰로 발견되지 않기도 한다.¹²⁾

1. 유병률

만져지는 갑상샘종의 유병률은 미국성인에서 4-7%이며¹³⁾ 연령에 따라 증가한다. 초음파에서 발견된 갑상샘종은 71%에서 1 cm 이하라고 하며 갑상샘종의 5.1%에서만 진찰상 만져진다.¹⁴⁾

Tan과 Gharib¹⁵⁾이 최근 15년 동안 발표된 논문들을 정리해 보고한 바에 따르면 부검사례에서 보면 30-60% 정도에서 갑상샘종이 발견된다고 한다. 임상에서는 초음파 등 영상검사로 발견되는 유병률은 13-50%이고, 무작위인구를 대상으로 한 전향적 연구에서는 19-67%라고 한다. 96,278명 독일근로자(18-65세)를 대상으로 한 연구에 따르면 초음파검사로 26-35세 여자에서 13%, 남자에서 9%이며, 나이가 55세 이상이면 여자에서 45%, 남자에서 32%로 증가하는 것으로 나타났다. 크기 별로 보면 0.5-1.0 cm은 인구의 10%, 1 cm 이상 결절은 11.9%에서 발견되었다.¹⁶⁾

국내에서는 초음파에서 우연히 발견되는 갑상샘 결절 유병률이 여자 28.3-42.2%,¹⁷⁻¹⁹⁾ 남자 14.1-29%^{18,20)}까지 다양하게 보고되고 있다.

부검사례에서 1 cm 이하의 미세유두암이 36%까지 발견되는 것으로 보고되고 있다.²¹⁾

2. 무증상 갑상샘종의 악성 비율과 예측 요인

Tan과 Gharib¹⁵⁾이 체계적 종설에서 방사선 조사를 받지 않은 무증상 갑상샘종의 경우 악성의 위험성은 0.45-13% (mean $\pm$ SD, 3.9 $\pm$ 4.1%)라고 하였다. Gough 등²²⁾의 체계적 종설에서는 9.2-13%라 하며 만져지는 갑상샘종의 악성비율과 다르지 않다고 한다.

즉 갑상샘종은 매우 흔히 발견되며 양성의 갑상샘종은 치료하지 않더라도 50% 정도에서 크기가 줄어든다. 대부분의 무증상 갑상샘종은 양성의 경과과정을 가지고 있고 몇 년후 추적검사에서 보면 없어지는 경우도 드물지 않다.²¹⁾

미세석회화, 저에코, 낭성변연보다 고형변연일 경우, 불

Table 2. Sonographic and clinical features of thyroid nodules and recommendations for FNA.²³⁾

Nodule sonographic or clinical features	Recommended nodule threshold size for FNA
High-risk history*	
Nodule WITH suspicious sonographic features [†]	> 5 mm (Recommendation [‡] A)
Nodule WITHOUT suspicious sonographic features [†]	> 5 mm (Recommendation I)
Abnormal cervical lymph nodes	All [‡] (Recommendation A)
Microcalcifications present in nodule	≥ 1 cm (Recommendation B)
Solid nodule	
AND hypoechoic	> 1 cm (Recommendation B)
AND iso- or hyperechoic	≥ 1–1.5 cm (Recommendation C)
Mixed cystic–solid nodule	
WITH any suspicious ultrasound features [†]	≥ 1.5–2.0 cm (Recommendation B)
WITHOUT suspicious ultrasound features	≥ 2.0 cm (Recommendation C)
Spongiform nodule	≥ 2.0 cm [§] (Recommendation C)
Purely cystic nodule	FNA not indicated (Recommendation E)

*High-risk history: History of thyroid cancer in one or more first degree relatives; history of external beam radiation as a child; exposure to ionizing radiation in childhood or adolescence; prior hemithyroidectomy with discovery of thyroid cancer, ¹⁸FDG avidity on PET scanning; MEN2/FMTC-associated RET protooncogene mutation, calcitonin > 100 pg/mL. MEN: multiple endocrine neoplasia, FMTC: familial medullary thyroid cancer.

[†]Suspicious features: microcalcifications; hypoechoic; increased nodular vascularity; infiltrative margins; taller than wide on transverse view.

[‡]FNA cytology may be obtained from the abnormal lymph node in lieu of the thyroid nodule.

[§]Sonographic monitoring without biopsy may be an acceptable alternative.

^{||} Unless indicated as therapeutic modality.

[‡]Recommendation A: Strongly recommends. The recommendation is based on good evidence that the service or intervention can improve important health outcomes. Evidence includes consistent results from well-designed, well-conducted studies in representative populations that directly assess effects on health outcomes.

Recommendation B: Recommends. The recommendation is based on fair evidence that the service or intervention can improve important health outcomes. The evidence is sufficient to determine effects on health outcomes, but the strength of the evidence is limited by the number, quality, or consistency of the individual studies; generalizability to routine practice; or indirect nature of the evidence on health outcomes.

Recommendation C: Recommends. The recommendation is based on expert opinion.

Recommendation D: Recommends against. The recommendation is based on expert opinion.

Recommendation E: Recommends against. The recommendation is based on fair evidence that the service or intervention does not improve important health outcomes or that harms outweigh benefits.

Recommendation I: Recommends neither for nor against. The panel concludes that the evidence is insufficient to recommend for or against providing the service or intervention because evidence is lacking that the service or intervention improves important health outcomes, the evidence is of poor quality, or the evidence is conflicting. As a result, the balance of benefits and harms cannot be determined.

Reprinted with permission from *Thyroid* 2009;19:1167-214. Table 3.

규칙적인 경계, 내부혈류 관찰 소견 등이 악성의 가능성을 제시하지만 불행히도 영상의학적 검사에서 악성과 양성을 명확히 구분하기는 어렵다. 결절 크기도 악성 예측요인이 되지 못하며, 고형병변일 경우 양성 예측도가 15.6–27%로 가장 높은 69–70%의 민감도를 보이는 예측 변수이다.

3. 무증상 갑상샘종의 관리 지침

FNAB의 발달로 만져지는 갑상샘종에 대한 최근의 진단적 접근방법이 변하고 있다.^{18,19)} 과거에는 갑상샘종이 만져지면 1차 진단 검사로 갑상샘 스캔을 시행하여 냉결절이나, 열결절이냐에 따라 관리지침을 결정하였다. 그러나 최근에서 1차

검사로 FNAB을 시행할 경우 수술을 25%나 감소시키는데 반해 암의 발견율은 30–50% 가량 높이기 때문에 FNAB를 가장 비용 효율적인 검사로 결론 내리고 있다. 과거 양성 갑상샘종에 대해 흔히 시행하였던 갑상샘호르몬 투여에 의한 억제요법이 최근에는 효용성에 대한 논란이 제기되고 있다.^{17,18)} 즉 잘 고안된 연구결과 억제요법에 의해 20% 이하에서만 갑상샘종이 줄어들고 있고 치료에 의해 발생한 무증상 갑상샘기능항진증의 부작용 등의 이유로 더 이상 일반적 치료방법으로 권유되고 있지 않다.¹⁷⁾

Tan과 Gharib¹⁵⁾은 병력과 크기, 초음파상의 모양에 따라 치료지침을 제시하고 있는데 초음파상 악성을 의심하는 소견을 보이거나, 방사선조사의 병력이 있거나 1.5 cm 이상인 경우 FNAB를 권유하고 있다. Tan과 Gharib¹⁵⁾ 초음파상 양성인면서 1.5 cm 이하인 갑상샘종은 단순히 관찰을 권유하고 있다. 미국에서 Drinka와 Nolton²⁴⁾은 노년에서 무증상 갑상샘종에 대하여 진찰상 만져질 때까지 더 이상 검사나 치료 또는 추적검사를 할 필요가 없다고 결론 내리고 있다. Gough 등²²⁾이 2008년 발표한 체계적 종설에서 5 mm 이하의 무증상 갑상샘종은 방사선 소견에서 의심소견이 없으면 반드시 그냥 둘 것을 권고하고 있으며 5–10 mm인 경우 조기진단과 수술적 절제 치료에 예후를 향상시킨다는 근거가 없으므로 FNAB없이 관찰하는 것이 합리적이며, 1 cm 이상인 경우에는 FNAB로 검사할 것을 권고하고 있다. FNAB는 추적검사에서 커지거나, 방사선에서 이상의심소견(미세석회화, 고형 병변일 경우, 내부혈류 관찰, 임파비대 중 하나)이 있는 경우에만 초기에 고려할 것을 권고하고 있다. 즉 무증상 갑상샘종은 발견 즉시 FNAB를 하기보다 6개월 후에 초음파 추적검사를 하고 1 cm 이상으로 커지는 등의 방사선 이상의심소견이 새로 발생한 경우에만 시행할 것을 권고하고 있다.²²⁾

2006년 미국갑상샘학회(American Thyroid Association, ATA)에서는 1 cm 이상인 경우에만 평가할 것을 권유하고 있다. 1 cm 이하인 경우에는 초음파상 이상소견이 있거나, 가족력이 있거나, 방사선조사 병력이 있는 경우에는 추가 평가를 고려할 수 있다고 권고하고 있다.¹⁸⁾ 2009년 개정된 ATA 권고지침은 조금 바뀌었는데, 1 cm 이상인 경우에만 평가할 것을 권유하고 있는 것은 2006년 권고지침과 같다. 비록 크기가 1 cm 이하이고 다른 이상의심소견이 없더라도 질병이환율과 사망을 유발할 수 있지만 이는 매우 드물어서 매우 드문 합병증을 예방하기 위해 시도하는 진단적 노력이 비용 효과가 나쁠 뿐만 아니라 이득보다 해가 높을 것이라는 내용을 덧붙이고 있다. 2009년에는 위험요인, 초음파 소견 등을 종합한 FNAB 권고지침을 제시하고 있다(Table 2).²³⁾

우연히 발견된 갑상샘종을 모두 조직검사를 하면 다음 이유로 불필요하게 조직검사의 비율이 매우 높아질 우려가 있다. 첫째, 미국에서 FNAB 사례의 5%만이 암으로 진단되었다.¹⁵⁾ 둘째, 미세유두암으로 진단받은 162명의 환자를 수술 없이 4년 동안 관찰한 결과 70%가 그대로 있었으며, 10.2%에서 크기가 1 cm 이상으로 커졌고, 국소 임파선 전이는 1.2% 뿐이었다. 4년 동안 결국 수술받은 34%에서 국소 임파선 전이는 50.5%, 8년 국소 재발이 5%였으나 갑상샘암에 의한 사망은 없었다.²⁵⁾

갑상샘암이 1.5 cm 이하라도 국소전이를 보이고 격막외 전이가 최대 59%까지 보이더라도 국소 재발률이 일반 명 중 2명 이하(0.014%)로 매우 낮으므로⁹⁾ 저자도 우리나라 의료환경을 고려하여 1.0 cm 이하이고 가족력이나 방사선 조사 병력이 없고 초음파상 악성이 의심되는 소견이 없다면 단순히 관찰하는 것이 적절하다고 보여진다.

환자가 불필요한 검사와 치료 등의 비용을 낭비하지 않게 적절한 관리지침을 제시하는 것도 가정의의 중요한 기능으로 보인다.

요약

갑상샘암의 증가는 실제 발생률의 증가라기 보다도 임상에서 갑상샘 초음파검사 시행이 증가하고, 이로 인해 발견된 무증상 갑상샘종의 추가 평가를 위해 시행된 침습검사의 시행도 갑상샘암의 발견에 기여하고 있으리라 보인다. 미국질병관리특별위원회, 한국인의 평생건강관리 프로그램 등 대다수 임상지침 관련 단체에서는 무증상성인에서는 갑상샘암의 선별을 권고하지 않는다. 무증상 갑상샘종은 크기가 1.0 cm 이상인 것만 평가해야 하며 크기가 1.0 cm 이하인 경우에는 가족력이나 방사선 조사 병력이 있거나 초음파상 악성이 의심되는 소견이 있는 경우에만 추가 검사를 하고, 추가 위험요인이 없다면 단순히 관찰하는 것이 적절하다.

중심단어: 갑상샘암; 선별검사; 무증상 갑상샘종

REFERENCES

1. Ministry for Health, Welfare and Family Affairs. Annual report of cancer incidence (2003–2005) in Korea. Seoul: Ministry for Health, Welfare and Family Affairs; c2008 [cited 2009 Nov 8].

- Available from: http://www.cancer.go.kr/cms/cancer/cancer_is/04/1191182_1753.html.
- Davies L, Welch HG. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002. *JAMA* 2006;295:2164-7.
 - Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. *CA Cancer J Clin* 2005;55:74-108.
 - USPTFS: guide to clinical preventive services, 2nd ed. Screening for thyroid cancer [Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1996 [cited 2009 Nov 8]. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=hscps2ed1996&part=A12305>.
 - American Cancer Society. Can thyroid cancer be found early? [Internet]. Atlanta: American Cancer Society; c2010 [cited 2009 Nov 8]. Available from: http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_3X_Can_Thyroid_Cancer_Be_Found_Early_43.asp?rnav=crl.
 - British Thyroid Association, Royal College of Physicians. Guidelines for the management of thyroid cancer. 2nd ed. London: Royal College of Physicians; 2007.
 - Cho JJ. Thyroid cancer In: Korean Academy of Family Medicine, editor. Korean lifetime health maintenance program. 3rd ed. Seoul: Korean Academy of Family Medicine; 2009. p. 168-79.
 - Haselkorn T, Stewart SL, Horn-Ross PL. Why are thyroid cancer rates so high in southeast asian women living in the United States? The bay area thyroid cancer study. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2003;12:144-50.
 - Park HL, Kwak JY, Yu PM, Cho YD. Occult papillary thyroid carcinoma analysis: 214 cases. *J Korean Surg Soc* 2007;72:177-83.
 - Lee J, Lee S, Rhee Y, Ahn CW, Cha BS, Kim KR, et al. Clinical characteristics of thyroid microcarcinomas with special reference to the prognostic factors. *Korean J Med* 2005; 69:503-9.
 - Yamada H, Katoh A, Ishinaga H. Ultrasonographic screening for thyroid cancer in the screening. *Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho* 2000;103:13-8.
 - Gharib H. Changing concepts in the diagnosis and management of thyroid nodules. *Endocrinol Metab Clin North Am* 1997;26:777-800.
 - Mazzaferri EL. Managing small thyroid cancers. *JAMA* 2006; 295:2179-82.
 - Elte JW, Mudde AH, Nieuwenhuijzen Kruseman AC. Subclinical thyroid disease. *Postgrad Med J* 1996;72:141-6.
 - Tan GH, Gharib H. Thyroid incidentalomas: management approaches to nonpalpable nodules discovered incidentally on thyroid imaging. *Ann Intern Med* 1997;126:226-31.
 - Reiners C, Wegscheider K, Schicha H, Theissen P, Vaupel R, Wrbitzky R, et al. Prevalence of thyroid disorders in the working population of Germany: ultrasonography screening in 96,278 unselected employees. *Thyroid* 2004;14:926-32.
 - Kim WJ, Kim JH, Park DW, Lee CB, Park YS, Kim DS, et al. Prevalence of thyroid nodules detected by ultrasonography in adults for health check-ups and analysis of fine needle aspiration cytology. *J Korean Soc Endocrinol* 2008;23:413-9.
 - Suk JH, Kim TY, Kim MK, Kim WB, Kim HK, Jeon SH, et al. Prevalence of ultrasonographically-detected thyroid nodules in adults without previous history of thyroid disease. *J Korean Soc Endocrinol* 2006;21:389-93.
 - Yim CH, Oh HJ, Chung HY, Han KO, Jang HC, Yoon HK, et al. Prevalence of thyroid nodules detected by ultrasonography in women attending health check-ups. *J Korean Soc Endocrinol* 2002;17:183-8.
 - Kim JH, Park SJ, Kim SE, Lee KH, Cho IK, Jang SI, et al. Prevalence of thyroid nodules detected by ultrasonography in adult men attending health check-ups. *J Korean Soc Endocrinol* 2007;22:112-7.
 - Howlett DC, Speirs A. The thyroid incidentaloma: ignore or investigate? *J Ultrasound Med* 2007;26:1367-71.
 - Gough J, Scott-Coombes D, Fausto Palazzo F. Thyroid incidentaloma: an evidence-based assessment of management strategy. *World J Surg* 2008;32:1264-8.
 - American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, Mandel SJ, et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. *Thyroid* 2009;19:1167-214.
 - Drinka PJ, Noltan WE. Subclinical hypothyroidism in the elderly: to treat or not to treat? *Am J Med Sci* 1988;295:125-8.
 - Ito Y, Uruno T, Nakano K, Takamura Y, Miya A, Kobayashi K, et al. An observation trial without surgical treatment in patients with papillary microcarcinoma of the thyroid. *Thyroid* 2003;13:381-7.